

Рис. 5. Клинический случай № 1. Вид пациентки при обращении. Переднебоковая проекция слева (а). Передняя проекция (б). Переднебоковая проекция справа (в)
 Fig. 5. Clinical example №1. Patient's appearance upon admission. Anterolateral projection on the left (a). Anterior projection (б). Anterolateral projection on the right (в)




Рис. 6. Вид пациентки спустя 1,5 года после подкожной мастэктомии слева с одномоментной реконструкцией силиконовым эндопротезом Mentor CPG33 380cc и биопсией «сторожевого» лимфатического узла. Профилактической мастэктомии справа с одномоментной реконструкцией силиконовым эндопротезом Mentor CPG33 380cc. Переднебоковая проекция справа (а). Передняя проекция (б). Переднебоковая проекция слева (в)
 Fig. 6. Patient's appearance 1.5 years after subcutaneous mastectomy on the left with simultaneous reconstruction using Mentor CPG33 380cc silicone endoprosthesis and sentinel lymph node biopsy. Prophylactic mastectomy on the right with simultaneous reconstruction using Mentor CPG33 380cc silicone endoprosthesis. Anterolateral projection on the right (a). Anterior projection (б). Anterolateral projection on the left (в)




Рис. 7. Клинический пример № 2. Вид пациентки при обращении. Переднебоковая проекция слева (а). Передняя проекция (б). Переднебоковая проекция справа (в)
 Fig. 7. Clinical example № 2. Patient's appearance upon admission. Anterolateral projection on the left (a). Anterior projection (б). Anterolateral projection on the right (в)




Рис. 8. Вид пациентки через 6 мес. после резекции левой молочной железы с биопсией «сторожевого» лимфатического узла, редуцирующей маммопластики справа. Удаление имплантатов с обеих сторон. Переднебоковая проекция справа (а).

Передняя проекция (б). Переднебоковая проекция слева (в)

Fig. 8. Patient's appearance 6 months after resection of the left breast with sentinel lymph node biopsy, reduction mammoplasty on the right. Removal of implants on both sides. Anterolateral projection on the right (a). Anterior projection (б). Anterolateral projection on the left (в)



Рис. 9. Клинический пример № 3. Вид пациентки при обращении. Передняя проекция (а). Переднебоковая проекция слева (б). Сосково-ареолярный комплекс справа (в). Сосково-ареолярный комплекс слева (г)

Fig. 9. Clinical example № 3. Patient's appearance upon presentation. Anterior projection (а). Anterolateral projection on the left (б). Nipple-areolar complex on the right (в). Nipple-areolar complex on the left (г)




Рис. 10. Вид пациентки спустя 2,0 года после кожносохранной мастэктомии с использованием торакодорзального лоскута, 1,5 года после реконструкции сосково-ареолярного комплекса. Переднебоковая проекция справа (а). Передняя проекция (б).

Переднебоковая проекция слева (в)

Fig. 10. Patient's appearance 2.0 years after skin-sparing mastectomy using a thoracodorsal flap, 1.5 years after reconstruction of the nipple-areolar complex. Anterolateral projection on the right (а). Anterior projection (б). Anterolateral projection on the left (в)




Рис. 11. Клинический пример № 4. Вид пациентки при обращении. Переднебоковая проекция слева (а). Передняя проекция (б). Переднебоковая проекция справа (в)
Fig. 11. Clinical example № 4. Patient's appearance upon admission. Anterolateral projection on the left (a). Anterior projection (б). Anterolateral projection on the right (в)




Рис. 12. Вид пациентки спустя 1,2 года после резекции правой молочной железы с биопсией «сторожевого» лимфатического узла.
Fig. 12. Patient's appearance 1.2 years after resection of the right mammary gland with sentinel lymph node biopsy. Anterolateral projection on the right (а). Anterior projection (б). Anterolateral projection on the left (в)