Н.В. Сачивко, Э.А. Жаврид, Е.В. Баранов, О.А. Коленик

ИНТЕРЛЕЙКИН-2 (РОНКОЛЕЙКИН) В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ В-КЛЕТОЧНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Минск, Беларусь

Представлены результаты рандомизированного проспективного исследования, в котором изучалось влияние гИЛ-2 («Ронколейкин®») на эффективность режима R-СНОР в первой линии химиотерапии больных В-клеточными неходжкинскими лимфомами. С марта 2006 года по декабрь 2009 года в исследование включено 109 пациентов с впервые установленным диагнозом. Стандартный режим R-СНОР получили 59 пациентов, у 50 он был дополнен гИЛ-2, который вводили подкожно по 1 000 000 МЕ в сутки во время каждого курса в 1-5-й дни. Установлено, что включение гИЛ-2 в режим R-СНОР повышает эффективность лечения В-клеточных НХЛ с высоким риском неблагоприятного течения болезни (МПИ 3–5).

Ключевые слова: неходжкинская лимфома, ритуксимаб, интерлейкин-2

В настоящее время стандартом лечения В-клеточных CD20-положительных НХЛ является включение в различные режимы химиотерапии ритуксимаба, моноклонального химерического антитела мыши/человека, относимого к иммуноглобулину класса G, которое специфически связывается с трансмембранным антигеном CD20 на поверхности нормальных и злокачественных В-клеток. Гибель опухолевых клеток при этом осуществляется как благодаря прямому антипролиферативному действию и индукции апоптоза, так и иммуноопосредованным механизмом, обусловленным антитело- и комплементзависимой цитотоксичностью [4,7,10]. Известно также, что ритуксимаб sensibilizует линии В-клеточной лимфомы человека к цитостатическому действию некоторых химиотерапевтических препаратов.

Первые клинические испытания и последующий опыт клинического применения показали широкие терапевтические возможности ритуксимаба. Добавление его к различным стандартным режимам химиотерапии значительно повышает долю полных ремиссий, снижает частоту рецидивов и случаев первичной химиорезистентности, увеличивает бессобытийную и общую выживаемость по сравнению со стандартным лече-

нием. Препарат эффективен как при агрессивном, так и индолентном протекающих вариантах болезни [17, 22-25].

Однако по мере накопления клинического опыта стало ясно, что несмотря на высокую эффективность в целом, определенное число больных демонстрируют резистентность к этому препарату. Это явилось побудительным мотивом к поиску средств усиления противоопухолевой активности ритуксимаба или преодоления резистентности к нему. Одним из таких подходов может быть дополнительное использование цитокинов, в частности, рекомбинантного интерлейкина-2 (гИЛ-2).

Целью нашего рандомизированного проспективного исследования явилась оценка эффективности и безопасности включения гИЛ-2 в схему R-СНОР у ранее нелеченных больных В-клеточными НХЛ.

Материалы и методы

В исследование включались первичные пациенты старше 18 лет с CD20-положительными В-клеточными НХЛ. Стадия болезни не ограничивалась. Пациенты с индолентными вариантами болезни должны были иметь показания для начала лечения. Общее состояние пациентов, оцениваемое по критериям Восточной онкологической группы (ECOG), должно было находиться в пределах 0–2 баллов, а ожидаемая длительность жизни составлять более 3 месяцев.

Критериями исключения служили: поражение центральной нервной системы, наличие тяжелой сопутствующей патологии или перенесенный ранее другой опухолевый процесс. Ограничительными лабораторными показателями для включения в исследование являлись: уровень креатина $\geq 150,0$ ммоль/л, билирубина $> 30,0$ ммоль/л, АСТ/АЛТ в 2,5 раза выше верхней границы нормального значения, содержание нейтрофилов $< 1,0 \cdot 10^9$ /л, тромбоцитов $< 75,0 \cdot 10^9$ /л, гемоглобина < 90 г/л.

Обязательное обследование до начала лечения включало: физикальный осмотр; рентгенографию органов грудной клетки; КТ органов грудной клетки, брюшной полости и таза; УЗИ периферических лимфатических узлов, брюшной полости и таза; миелограмму и трепан-биопсию костного мозга; скintiграфию тела с ^{67}Ga ; общий и биохимический анализы крови; эхокардиографию; цитологическое исследование спинномозговой жидкости у пациентов с поражением яичек или черепа.

Распределение на группы лечения осуществлялось посредством централизованной компьютерной системы после включения пациента в исследование.

Таблица 1

Характеристика больных

Параметры	Группы больных	
	R-СНОР	R-СНОР+гИЛ-2
Число больных	59	50
Пол (муж/жен)	28/31	19/31
Возраст, ME лет (колебания) ≥ 60 лет	55 (19-78)	47 (19-76)
Стадия болезни I-II	23 (39,0%)	12 (24,0%)
III-IV	36 (61,0%)	38 (76,0%)
ЛДГ > N	32 (54,2%)	28 (56,0%)
Физический статус (ЕСОГ) ≥ 2	21 (35,6%)	19 (38,0%)
Экстранодальное поражение ≥ 2	24 (40,7%)	21 (42,0%)
МПИ 0-1	15 (25,4%)	9 (18,0%)
2	13 (22,0%)	10 (20,0%)
≥ 3	31 (52,5%)	31 (62,0%)
Морфологические варианты		
диффузная крупноклеточная	40 (67,8%)	34 (68,0%)
фоликулярная	4 (6,8%)	3 (6,0%)
лимфоцитарная	11 (18,6%)	8 (16,0%)
мантинноклеточная	4 (6,8%)	5 (10,0%)
Экстранодальное поражение		
костный мозг	15 (25,4%)	12 (24,0%)
лёгкие	4 (6,8%)	6 (12,0%)
плевра	4 (6,8%)	6 (12,0%)
печень	7 (11,8%)	5 (10,0%)
желудочно-кишечный тракт	5 (8,5%)	6 (12,0%)
скелет	9 (15,2%)	5 (10%)
яичники	1 (1,7%)	1 (2,0%)
яички	1 (1,7%)	0

Таблица 2

Непосредственные результаты лечения

Ответ на лечение	Режим R-СНОР n 59	Режим R-СНОР+гИЛ-2 n 50
Полный	27 (45,8 $\pm$ 6,5%)	19 (38,0 $\pm$ 6,8%)
Полный неподтверждённый	13 (22,0 $\pm$ 5,4%)	17 (34,0 $\pm$ 6,7%)
Частичный	10 (16,9 $\pm$ 4,9%)	10 (20,0 $\pm$ 5,2%)
Общий	50 (84,7 $\pm$ 4,7%)	46 (92,0 $\pm$ 3,8%)
Стабилизация	4 (6,8 $\pm$ 3,4%)	0
Прогрессирование	5 (8,5 $\pm$ 3,6%)	4 (8,0 $\pm$ 3,5%)

Лечение. При использовании режима R-СНОР пациенты получали в 1-й день каждого цикла ритуксимаб в дозе 375 мг/м², во 2-й день — циклофосфамид 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м² и винкристин 1,4 мг/м² (мах 2 мг). Преднизолон в дозе 60 мг/м² (мах 100 мг) назначался в 1–5-й дни с постепенной отменой в течение 3 последующих дней. В группе R-СНОР+гИЛ-2 пациенты дополнительно к режиму R-СНОР получали подкожно гИЛ-2 (Ронколейкин, Биотех, Россия) по 500 000 МЕ 2 раза в сутки с интервалом 12 часов или по 1 000 000 МЕ один раз в сутки с 1-го по 5-й день. Курсы повторялись каждые 3 недели до 8 циклов.

Оценка результатов исследования. Первичной конечной точкой исследования являлась выживаемость без прогрессирования. К вторичным точкам относили общую выживаемость и непосредственную эффективность лечения. Ответ на терапию оценивали после 4 курсов и спустя 30 дней после завершения последнего курса. При рестадировании использовались методы обследования, с помощью которых были установлены очаги поражения при первичном стадировании. Чувствительность к лечению оценивали в соответствии с критериями Международной рабочей группы по 5 параметрам: полный ответ, неподтверждённый полный ответ, частичный ответ, стабилизация и прогрессирование [5]. В последующем пациенты обследовались каждые 3 мес. в течение 2 лет, а затем — 1 раз в полгода.

Характеристика пациентов. В исследование с марта 2006 г. по декабрь 2009 г. включено 109 пациентов. Из них 59 получали режим R-СНОР, а 50 — режим R-СНОР+гИЛ-2. Оценка результатов лечения проведена в апреле 2012 г.

Восемь запланированных курсов химиотерапии получили 66,1% пациентов в группе R-СНОР и 76% в группе R-СНОР+гИЛ-2. Эти различия обусловлены тем, что в группе R-СНОР было больше пациентов с неудачами лечения, когда использование данного режима было бесперспективным и требовалась его замена (15,2% против 8%).

По основным параметрам, имеющим прогностическое значение, сравниваемые группы существенно не отличались (табл. 1).

Примерно треть пациентов в каждой группе были в возрасте ≥ 60 лет (39% в группе R-СНОР и 32% в группе R-СНОР+гИЛ-2), большинство имели распространенную (III-IV) стадию болезни (61% R-СНОР и 76% в группе R-СНОР+гИЛ-2). К неблагоприятной прогностической группе (МПИ ≥ 3) относилось 52,5% пациентов группы R-СНОР и 62% группы R-СНОР+гИЛ-2. Диффузная В-крупноклеточная НХЛ была преобладающим вариантом в обеих группах 68%. Не отличались также группы существенно как по характеру, так и частоте экстранодального поражения.

Вместе с тем группа пациентов, получавших режим R-СНОР+гИЛ-2, может быть оценена как менее благоприятная. В её состав входило относительно большее число пациентов с распространённой стадией болезни (76% против 61%), а также с высоким риском (МПИ 3-5) неблагоприятного течения болезни (62% против 52,5%).

Результаты лечения

Непосредственный ответ на лечение оценен у всех включённых в исследование пациентов. Ответили на индукционную терапию в группе R-СНОР+гИЛ-2 92% пациентов, при этом полные и полные неподтверждённые ответы имели место в 72%, частичные — в 20% случаев. В сравниваемой группе R-СНОР частота общих ответов составила 84,7% с долей полных и полных неподтверждённых ответов 67,8%, частичных 16,9% (табл. 2).

Хотя различия по этим показателям между группами практически отсутствуют, полученные данные позволяют высказать мнение о наличии

тенденции к улучшению результатов при включении гИЛ-2 в режим R-СНОР. Важным является некоторое увеличение частоты полных и полных неподтверждённых ответов (72% против 67,8%) и уменьшение почти в 2 раза частоты неудач лечения, к которым относили стабилизацию и прогрессирование болезни (8% против 15,2%).

Как следует из рис.1, на котором представлены кривые выживаемости без прогрессирования всех включённых в исследование пациентов, большинство неблагоприятных событий относилось к двум первым годам наблюдения.

При этом их было на 10% больше в группе R-СНОР, чем в группе R-СНОР+гИЛ-2 (33,9% и 24,9% соответственно). Хотя в целом различия между группами статистически не достоверны, имеющиеся данные позволяют отметить наличие тенденции к улучшению результатов при включении гИЛ-2 в режим R-СНОР.

Без прогрессирования в группе R-СНОР+гИЛ-2 один год прожили 83,3%, два года—72,9%, три года—65,6%. В группе R-СНОР эти показатели составили 73%, 62,8% и 56,9% соответственно. Эта тенденция сохраняется и по показателю общей выживаемости (рис.2). Разница в 3-хлетней выживаемости между группами составила 11,5% (logrank 0,24).

Анализ результатов по группам риска показал, что у пациентов прогностически благоприятной группы (МПИ 0-2), т.е. без факторов риска или с 1-2 факторами, включение гИЛ-2 в режим R-СНОР не оказало влияния ни на выживаемость без прогрессирования (рис.3), ни на общую выживаемость (рис.4).

Напротив, у пациентов с высоким риском неблагоприятного течения болезни (МПИ 3-5) дополнительное введение гИЛ-2 сопровождалось повышением эффективности лечения. Трёхлетняя выживаемость без прогрессирования (рис.5) при использовании режима R-СНОР+гИЛ-2 оказалась на 26,2% выше, чем в группе R-СНОР, и составила соответственно 62,1% и 35,9% (logrank 0,05). Различия в 3-летней общей выживаемости (рис.6) не достигло статистической значимости (logrank 0,13), однако сохраняется явная тенденция к повышению результатов при применении гИЛ-2.

Преобладающим вариантом НХЛ в обеих группах пациентов была диффузная В-крупноклеточная лимфома, что позволило проанализировать результаты при данном варианте отдельно. Сравнение показателей выживаемости пациентов диффузной В-крупноклеточной НХЛ в целом, получавших и не получавших гИЛ-2, как и при анализе всего материала, выявило лишь тенденцию к улучшению результатов при дополнительном введении цитокина (logrank

0,28). Анализ же по группам риска показал, что чем менее благоприятным был прогноз, тем более определённым было влияние гИЛ-2. Если у пациентов благоприятной прогностической группы (МПИ 0-1) показатели практически не отличались, то у пациентов с МПИ ≥ 2 применение гИЛ-2 привело к достоверному (logrank 0,05) повышению выживаемости без прогрессирования на 21% (69,5% против 48,8%). При этом наиболее выраженным оказалось влияние гИЛ-2, как и по материалу в целом, на эффективность лечения пациентов наиболее неблагоприятной прогностической группы (МПИ 3-5). У этих пациентов при применении гИЛ-2 без прогрессирования 1 год прожили 80,5% пациентов, 2 года—63,9%, 3 года 59,8%. В группе R-СНОР эти показатели составили 50%, 31,3% и 27,3%, соответственно (logrank 0,037) (рис.7).

Общая выживаемость пациентов этой высокой группы риска (рис.8) при применении гИЛ-2 также оказалась статистически значимо выше, чем в контрольной группе.

Обсуждение

Внедрение в клиническую практику ритуксимаба позволило значительно повысить эффективность лечения В-клеточных НХЛ различных прогностических групп, что подтверждено многочисленными рандомизированными исследованиями. Однако клинический опыт показал, что у определённого числа больных имеется резистентность к этому моноклональному антителу, механизм развития которой не совсем ясен. Предполагается, что помимо отсутствия CD20-антигена [12, 21], такая ситуация может быть связана с активацией путей выживаемости В-клеток [18], повышением экспрессии ингибиторов комплемента CD55 и CD59 [14, 16] или повреждением функции клеточных медиаторов антителозависимой клеточной цитотоксичности [9, 15]. Разработка подходов к преодолению этих возможных механизмов резистентности ритуксимаба может быть одним из методов повышения его эффективности. В этом плане весьма перспективным представляется использование цитокинов, в частности ИЛ-2, который обладает многочисленными функциями и является центральным регулятором иммунного ответа.

В рассматриваемом нами аспекте одной из важнейших его функций следует считать стимуляцию пролиферации антигенактивированных CD4⁺ и CD8⁺ лимфоцитов, что приводит к их клональному увеличению, и стимуляцию цитотоксической активности CD8⁺лимфоцитов. Весьма важным является также увеличение под действием ИЛ-2 цитотоксической активности

Рис. 1. Выживаемость без прогрессирования всех пациентов

Рис. 5. Выживаемость без прогрессирования пациентов с МПИ 3-5

Рис. 2. Общая выживаемость всех пациентов по группам

Рис. 6. Общая выживаемость пациентов с МПИ 3-5

Рис. 3. Выживаемость без прогрессирования больных с МПИ 0-2

Рис. 7. Выживаемость без прогрессирования пациентов диффузными В-крупноклеточными лимфомами с МПИ 3-5

Рис. 4. Общая выживаемость больных с МПИ 0-2

Рис. 8. Общая выживаемость без прогрессирования пациентов диффузными В-крупноклеточными лимфомами с МПИ 3-5

НК-клеток, выполняющих главную роль в уничтожении опухолевых клеток.

Если принять во внимание, что одним из механизмов действия ритуксимаба является антителозависимая цитотоксичность, то теоретически можно предположить, что добавление ИЛ-2 в ритуксимаб-содержащие режимы химиотерапии может повысить обусловленную ритуксимабом антителозависимую цитотоксичность, а также повысить цитотоксичность НК-клеток. Это в конечном итоге должно привести к повышению эффективности лечения. Данная концепция имеет подтверждение в ряде выполненных доклинических и клинических исследований I фазы [15, 11, 13, 20]. Помимо иммуномодулирующего противоопухолевого эффекта, ИЛ-2 затрагивает и такие механизмы противоопухолевого действия, как прямой апоптоз опухолевых клеток, ингибирование ангиогенеза и подавление экспрессии ростковых факторов [1, 6].

Клинических исследований о применении ИЛ-2 у пациентов злокачественными лимфомами очень мало. Практически все они касаются лечения пациентов с неудачами стандартной противоопухолевой терапии [2, 3, 14]. Использовался цитокин как в низких, так и в высоких дозах. Хотя опубликованные результаты и отличаются по эффективности, они дают основание заключить, что ИЛ-2 обладает определённой противоопухолевой активностью. При использовании ИЛ-2 в низких дозах в исследовании Allison et al. [2] из 4 пациентов фолликулярной лимфомой ответили на лечение двое и пять из 25 пациентов с агрессивными вариантами, при этом у трёх имел место полный эффект. Эти результаты, по мнению авторов, учитывая многократность предшествующего лечения, сравнимы с результатами монотерапии цитостатическими агентами. В многоцентровом исследовании Gisselbrecht et al. [14] оценены результаты применения высокодозного ИЛ-2 у пациентов с различными типами лимфом (низкоккачественные 24, агрессивные 23, лимфома Ходжкина 7, грибовидный микоз 7). Объективный ответ на лечение получен в 16,4% случаев при частоте полных ответов 8,2%. Наиболее успешной терапия оказалась для пациентов агрессивными лимфомами (объективный ответ у 21,7% при частоте полных 13%) и грибовидным микозом (объективный ответ на лечение — 71,4% при одном полном ответе).

Концепция, что ИЛ-2 повышает антителозависимую цитотоксичность ритуксимаба и повышает цитотоксическую активность НК-клеток, также подтверждается данными предклинических и I фазы клинических исследований [15, 11, 20, 13]. Что касается имеющихся данных, то опубликованные результаты весьма противо-

речивы. В исследовании Friedberg et al. [13] 20 пациентов рецидивной или резистентной фолликулярной лимфомой, не получавших ранее ритуксимаба, лечили гИЛ-2 в комбинации с ритуксимабом. Ответили на лечение 11 пациентов (55%), у 4 пациентов (20%) имела место стабилизация. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 13 мес. Gluck et al. [15] приводят результаты применения ритуксимаба в сочетании с гИЛ-2 у 30 многократно леченных пациентов с различными вариантами В-клеточных НХЛ, большинство из которых ранее получали ритуксимаб. Частота ответа на данное лечение составила 29% у пациентов при ежедневном введении гИЛ-2 и у 54% при применении 3 раза в неделю.

В многоцентровом исследовании II фазы [19] комбинация гИЛ-2 и ритуксимаба использовалась для лечения больных низкоккачественными НХЛ, резистентными к ритуксимабу. Ответили на лечение только 5 (9,4%) из 53 оцененных пациентов. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 9,2 мес. У 42 пациентов наблюдалась стабилизация болезни (79,2%) с медианой выживаемости до прогрессирования 4,5 мес.

Несмотря на отсутствие пока убедительных клинических данных о том, что одновременное применение гИЛ-2 и ритуксимаба повышает эффективность последнего, все исследователи сходятся во мнении о необходимости продолжения исследований в этом направлении.

В настоящей публикации представлены результаты выполненного рандомизированного исследования, в котором изучалось влияние гИЛ-2 на эффективность режима R-СНОР у больных НХЛ в первой линии лечения.

Мировой опыт использования ИЛ-2 в лечении онкологических больных базируется, главным образом, на данных о применении препаратов, полученных генно-инженерным способом путём внедрения соответствующего гена в ДНК *E. Coli*. В нашем исследовании использовался гИЛ-2 «Ронколейкин®», полученный из клеток рекомбинантного штамма непатогенных пекарских дрожжей (ООО «БИОТЕХ»), в генетический аппарат которого встроен человеческий ИЛ-2. Структурно и функционально он является полным аналогом эндогенного ИЛ-2 и обладает всеми типовыми биологическими эффектами, которые свойственны данному цитокину. По сравнению с бактериальным аналогом ронколейкин значительно менее токсичен.

По показателям непосредственной эффективности различий между группами выявлено не было. Частота общих ответов на лечение (92% в группе R-СНОР+гИЛ-2 и 84,7% в группе R-СНОР), в том числе и полных/полных не-

подтверждённых (72% и 67,8% соответственно), в сравниваемых группах практически не отличались. Однако включение rИЛ-2 в режим R-СНОР позволило в два раза уменьшить число больных с неудачами лечения, к которым относили прогрессирование опухолевого процесса и стабилизацию заболевания.

Не выявлено на имеющиеся клиническом материале статистически значимых различий между экспериментальной и контрольной группами также по показателю выживаемости без прогрессирования (при оценке материала в целом). Полученные данные позволяют лишь говорить, что при включении rИЛ-2 в режим R-СНОР имеется тенденция к её повышению (log. 0,29). Эта тенденция сохраняется и по показателю общей выживаемости (log. 0,24).

Анализ результатов в зависимости от групп риска показал, что включение rИЛ-2 в режим R-СНОР у пациентов благоприятного (МПИ 0–1) и низкого промежуточного риска (МПИ 2) не оказало практически влияния ни на выживаемость без прогрессирования, ни на общую выживаемость. Весьма неожиданным оказалось, что при присоединении rИЛ-2 к режиму R-СНОР наибольшую пользу получили пациенты с высоким риском неблагоприятного течения болезни. Различия между группами здесь как по показателю выживаемости без прогрессирования (log. 0,037), так и по показателю общей выживаемости (log. 0,016), статистически значимы. При равной непосредственной эффективности это даёт основание предполагать, что rИЛ-2 позволяет более длительно поддерживать достигнутый лечебный эффект.

Добавление ронколейкина в использованных дозах к режиму R-СНОР не усиливало токсичность последнего и не ухудшало переносимость лечения в целом. Следует отметить, однако, относительно высокую частоту инфекционных осложнений, относимых к III–IV степени тяжести в обеих группах пациентов (3,8% в группе R-СНОР и 3,2% в группе R-СНОР+rИЛ-2). Объяснение этому факту мы связываем с механизмом действия ритуксимаба, который вызывает гибель не только опухолевых, но и нормальных лимфоцитов, продуцирующих иммуноглобулины и отвечающих за гуморальный иммунитет, что потенциально опасно как в плане увеличения инфекционных осложнений, так и их тяжести. Поэтому при применении ритуксимаба целесообразно назначение с профилактической целью средств, предупреждающих развитие инфекционных осложнений (таких, как ко-тримоксазол и противовирусные препараты).

Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, что добавление rИЛ-2

к режиму R-СНОР повышает эффективность лечения пациентов В-клеточными НХЛ в первой линии терапии с высоким риском неблагоприятного течения болезни (МПИ 3–5). Исследования в этом направлении должны продолжаться. Используемый режим применения rИЛ-2 в данном исследовании не следует рассматривать как единственно возможный. Разработка и апробация новых режимов может быть направлением дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пальцев М.А., Иванов А.А. Межклеточное взаимодействие. — М.: Медицина. — 1995. — 224 с.
2. Allison M.A., Jones S.E., McGuffy Phase I trial of outpatient interleukin-2 in malignant lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, and Selected solid tumors // *J. Clin. Oncol.* — 1989. — Vol.7. — P. 75-81.
3. Bernstein Z.P., Vaickus L., Friedman N. et al Interleukin-2 lymphokine activated killer cell therapy of non-Hodgkin's lymphoma and Hodgkin's disease // *J. Immunother.* — 1991. — Vol. 10. — P. 141-145.
4. Cemy T., Borisch B., Intona M. et al. Mechanism of action of rituximab// *Anticancer Drugs.* — 2002. — Vol. 13. — P. 3–10.
5. Cheson B.D. Horning S.J., Coiffer B. et al. Report of an international work-shop to standardize response criteria for non-Hodgkin's lymphoma// *J. Clin. Oncol.* — 1999. — Vol. 17. — P. 1244-1263.
6. Christopher S.N., Novick A.C., Tonnenbaum C.S. et al. Mechanisms of immune evasion by renal cell carcinoma: tumor-induced T-lymphocyte apoptosis and NFkB suppression// *Urology.* — 2002. — Vol. 59. — P. 9-14.
7. Cragg M.S., Glennie M.J. Antibody specificity controls in vivo effector mechanisms of anti-CD20 reagents // *Blood.* — 2004. — Vol. 103. — P. 2728-2743.
8. Dalle S., Dupire S., Brunet-Manquat S. et al. In vivo model of follicular lymphoma resistant to rituximab // *Clin. Cancer Res.* — 2009. — Vol. 15. — P. 851-857.
9. Dall'Ozzo S., Tartas S., Paintaud G. et al. Rituximab-dependent cytotoxicity by natural killer cells: influence of FCGR3A polymorphism on the concentration-effect relationship// *Cancer Res.* — 2004. — Vol. 64. — P. 4664-4669.
10. Eisenbeis C.F., Colegiuri M.A., Byrd J.S. Rituximab: Converging mechanisms of action in non-Hodgkin's Lymphoma// *Clin. Cancer Res.* — 2003. — Vol. 9. — P. 5810-5812.
11. Eisenbeis C.F., Grainger A., Fisher B. et al. Combination immunotherapy of B-cell non-Hodgkin's Lymphoma with rituximab and interleukin-2: a preclinical and phase I study// *Clin. Cancer Res.* — 2004. — Vol. 10. — P. 6101-6110.
12. Foran J.M., Narton A.J., Micallef I.N. et al. Loss of CD20 expression following treatment with rituximab (chimeric monoclonal anti-CD20): a retrospective cohort analysis// *Br. J. Haematol.* — 2001. — Vol. 114. — P. 881-883.
13. Friedberg J.W., Neuberg D., Gribben J.G. et al. Combination immunotherapy with rituximab and interleukin-2 in patients with relapsed or refractory follicular non-Hodgkin's lymphoma// *Brit. J. Haematol.* — 2002. — Vol. 117. — P. 828-834.

14. Gisselbrecht C., Maraninchi D., Pico J.L. et al. Interleukin-2 treatment in lymphoma: a phase II multicenter study// *Blood*. — 2008. — Vol. 83. — P. 2081-2085.
15. Gluck W.L., Hurst D., Yuen A. et al. Phase I studies of interleukin (IL-2) and rituximab in B-cell non-Hodgkin's lymphoma: IL-2 mediated natural killer cell expansion correlates with clinical response// *Clin. Cancer Res.* — 2004. — Vol. 10. — P. 2553-2564.
16. Golay J., Lazzari M., Facchinetti V. et al. CD20 levels determine the in vitro susceptibility to rituximab and complement of B-cell chronic lymphocytic leukemia: further regulation by CD55 and CD95// *Blood*. — 2001. — Vol. 98. — P. 3383-3389.
17. Herold M., Pasold R., Srock S. et al. Results of a prospective randomized open label phase III study comparing rituximab plus mitoxantrone, chlorambucil, prednisolone chemotherapy (R-MCP) versus MCR alone in untreated advanced indolent non-Hodgkin's lymphoma (NHL) and mantle cell lymphoma (MCL)// *Blood*. — 2004. — Vol. 104. — Abs. 584.
18. Jazirehi A.R., Vega M.I., Bonavida B. Development of rituximab-resistant lymphoma clones with altered cell signaling and cross-resistance to chemotherapy// *Cancer Res.* — 2007. — Vol. 67. — P. 1270-1281.
19. Khan K.D., Emmanouilides C., Be3nson D.M. et al. A phase II study of rituximab in combination with recombinant interleukin-2 for rituximab-refractory indolent non-Hodgkin's lymphoma// *Clin. Cancer Res.* — 2006. — Vol. 12. — P. 7046-7053.
20. Lopes de Menezes D.E., Denis-Mize K., Tang Y. et al. Recombinant interleukin-2 significantly augments activity of rituximab in human tumor xenograft models of B-cell non-Hodgkin's lymphoma// *J. Immunother.* — 2007. — Vol. 30. — P. 64-74.
21. Maeshima A.M., Taniguchi H., Nomoto J. et al. Histological and immunophenotypic changes in 59 cases of B-cell non-Hodgkin's lymphoma after rituximab therapy// *Cancer Sci.* — 2009. — Vol. 100 — P. 54-61.
22. Marcus R., Solal-Gelingny P., Imrie K. et al. MabThera (Rituximab) plus cyclophosphamide, vincristine and prednisolone (CVP) chemotherapy improves survival in previously untreated patients with advanced follicular non-Hodgkin's Lymphoma (NHL)// *Blood*. — 2005. — Vol. 108. — Abs.481.
23. Pfreundschuh M., Schubert J., Ziepert M. et al. Six versus eight cycles of bi-weekly CHOP-14 with or without rituximab in elderly patients with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: a randomized controlled trial (RICOVER-60)// *Lancet Oncol.* — 2008. — Vol. 9. — P. 105-116.
24. Vose J.M., Link B.K., Grossbard et al. Phase II study of rituximab in combination with CHOP chemotherapy in patients with previously treated aggressive non-Hodgkin's Lymphoma// *J. Clin. Oncol.* — 2001. — Vol. 19 — P. 389-397.
25. Weisenburger F.K., Choi W.W., Perry K.D. et al. Addition of rituximab to standard chemotherapy improves the survival of both the germinal center B-cell-like subtypes of diffuse large B-cell lymphoma// *J. Clin. Oncol.* — 2008. — Vol. 26. — P. 4587-4594.

*N.V.Sachivko, E.A. Zhavrid, E.V. Baranov,
O.A.Kolenik*

INTERLEUKIN-2 (RONKOLEYKIN) IN THE FIRST-LINE CHEMOTHERAPY OF B-CELL NON-HODGKIN'S LYMPHOMA

N.N. Alexandrov Republican Scientific and Practical
Centre of Oncology and Medical Radiology, Minsk,
Belarus

It is presented the results of a randomized prospective study, which there was examined the influence of rIL-2 ("Ronkoleykin ®») on the effectiveness of the regime R-CHOP in first-line treatment of patients with B-cell non-Hodgkin's lymphomas. From March 2006 to December 2009, the study included 109 newly diagnosed patients. Standard mode R-CHOP was used in 59 patients, in 50 was added rIL-2, which was injected subcutaneously with 1 million IU per day during each course in 1-5th days. It was found that the inclusion of rIL-2 in the R-CHOP regimen increased the effectiveness of the treatment of B-cell NHL with a high-risk of poor disease's course.

Поступила в редакцию 05.12.2012