

Рис. 1. Распределение молекулярно-биологических подтипов РМЖ в выборке
Fig. 1. Distribution of molecular biological subtypes of breast cancer (BC) in the study sample





Рис. 2. Распределение пациенток по стадиям РМЖ согласно классификации TNM
Fig. 2. Distribution of patients by BC stage according to the TNM classification



	Прогрессирование / Progression, %	Стабилизация / Stabilization, %	Частичный ответ / Partial response, %	Выраженный ответ / Pronounced response, %	Полный ответ / Complete response, %
После 2-3 циклов / After 2-3 cycles	1.4	41.7	40.3	11.3	5.7
После 4-6 циклов / After 4-6 cycles	1.1	22.1	32.4	26.1	18.4

Рис. 3. Ответ опухоли по данным маммосцинтиграфии, проведенной после двух-трех и четырех-шести циклов неоадъювантной системной терапии
Fig. 3. Tumor response according to mammoscintigraphy performed after 2–3 and 4–6 cycles of neoadjuvant systemic therapy




Рис. 4. Степень лечебного патоморфоза рака молочной железы после неоадъювантной системной терапии по классификации Miller — Payne в исследованной группе (n = 358)
Fig. 4. Degree of therapeutic pathomorphosis of breast cancer after neoadjuvant systemic therapy according to the Miller — Payne classification in the study group (n = 358)




Рис. 5. Сцинтиграфический ответ опухоли после двух-трех циклов НАСТ в зависимости от молекулярно-биологических подтипов РМЖ в исследованной группе больных (n = 264)
Fig. 5. Scintigraphic tumor response after 2–3 cycles of NAST according to molecular biological subtypes of BC in the study group (n = 264)




Рис. 6. Сцинтиграфический ответ опухоли после четырех-шести циклов НАСТ в зависимости от молекулярно-биологических подтипов РМЖ в исследованной группе больных (n = 252)
Fig. 6. Scintigraphic tumor response after 4–6 cycles of NAST according to molecular biological subtypes of BC in the study group (n = 252)




Рис. 7. Патоморфологический регресс опухоли по классификации Miller — Payne у больных с различными молекулярно-биологическими подтипами РМЖ
Fig. 7. Pathomorphological tumor regression according to the Miller — Payne classification in patients with different molecular biological subtypes of BC