Таблица 2. Результаты однофакторного анализа клинических параметров, связанных с риском возникновения локальных и регионарных рецидивов

Параметр	Частота локальных рецидивов, n (%)	p	Частота регионарных рецидивов, n (%)	p
Гистологический тип				
Аденокарцинома	3/19 (15,8 %)	0,067	1/19 (5,3 %)	0,54
Плоскоклеточный рак	6/142 (4,2 %)		5/142 (3,5 %)	
Длительность лечения				
> 56 дней	4/33 (12,1 %)	0,04	3/33 (9,1 %)	0,09
≤ 56 дней	5/131 (3,8 %)		3/131 (2,3 %)	
Количество введений цисплатина				
< 5 введений	5/71 (7,0 %)	0,42	3/71 (4,2 %)	0,75
≥ 5 введений	4/93 (4,3 %)		3/93 (3,2 %)	
Размер первичной опухоли				
≥ 5 см	8/47 (17,0 %)	<0,001	3/47 (6,4 %)	0,21
< 5 см	1/117 (0,9 %)		3/117 (2,6 %)	
Размер метастатических лимфоузлов				
> 2 см	–	–	4/45 (8,9 %)	0,04
≤ 2 см	–	–	2/119 (1,7 %)	
«Boost» на пораженные лимфоузлы				
Без «boost»	–	–	6/125 (4,8 %)	0,034*
С «boost»	–	–	0/39 (0 %)	

Представлены результаты однофакторного анализа (χ^2-тест или точный критерий Фишера). *p-значение для фактора «boost» рассчитано с использованием точного критерия Фишера в связи с наличием нулевого события в группе.

Table 2. Results of univariable analysis of clinical parameters associated with the risk of local and regional recurrences

Parameter	Local recurrence rate, n (%)	p	Regional recurrence rate, n (%)	p
Histological type				
Adenocarcinoma	3/19 (15.8 %)	0.067	1/19 (5.3 %)	0.54
Squamous cell carcinoma	6/142 (4.2 %)		5/142 (3.5 %)	
Treatment duration				
> 56 days	4/33 (12.1 %)	0.04	3/33 (9.1 %)	0.09
≤ 56 days	5/131 (3.8 %)		3/131 (2.3 %)	
Number of cisplatin administrations				
< 5 administrations	5/71 (7.0 %)	0.42	3/71 (4.2 %)	0.75
≥ 5 administrations	4/93 (4.3 %)		3/93 (3.2 %)	
Primary tumor size				
≥ 5 cm	8/47 (17.0 %)	<0.001	3/47 (6.4 %)	0.21
< 5 cm	1/117 (0.9 %)		3/117 (2.6 %)	
Metastatic lymph node size				
> 2 cm	–	–	4/45 (8.9 %)	0.04
≤ 2 cm	–	–	2/119 (1.7 %)	
Boost to involved lymph nodes				
No boost	–	–	6/125 (4.8 %)	0.034*
Boost	–	–	0/39 (0 %)	

Results of univariable analysis (χ^2 test or Fisher's exact test) are presented. * The p-value for the boost factor was calculated using Fisher's exact test due to the presence of zero events in the boost group.