

Приложение 1. Клинико-морфологические характеристики пациентов, включенных в исследование (информация доступна для 134 пациентов)

		Количество пациентов (n, %)
Пол	Женский	55 (41,0 %)
	Мужской	78 (58,2 %)
	Нет данных	1 (0,8 %)
Возраст (среднее ± SD), лет	62,6 ± 12,5	130 ¹
Сторона поражения	Правая	0 (0 %)
	Левая	93 (69,4 %)
	Прямая кишка	31 (23,1 %)
	Нет данных	10 (7,5 %)
Локализация первичной опухоли	Нисходящая кишка	10 (7,5 %)
	Сигмовидная кишка	62 (46,3 %)
	Ректосигмоидный отдел	16 (11,9 %)
	Прямая кишка	31 (23,1 %)
	Нет данных	15 (11,2 %)
Степень дифференцировки	G1	21 (15,7 %)
	G2	73 (54,4 %)
	G3	12 (9,0 %)
	Нет данных	28 (20,9 %)
Стадия заболевания	I	1 (0,7 %)
	II	8 (6,0 %)
	III	12 (9,0 %)
	IV	102 (76,1 %)
	Нет данных	11 (8,2 %)
Число пораженных органов на момент включения в исследование	Один	48 (35,8 %)
	Два или более	86 (64,2 %)

¹Количество пациентов, для которых доступна информация, SD — стандартное отклонение.

Appendix 1. Clinical and morphological characteristics of the study population (n = 134)

		Number of patients (n, %)
Sex	Female	55 (41.0 %)
	Male	78 (58.2 %)
	No data	1 (0.8 %)
Age (mean ± SD)	62.6 ± 12.5	130 ¹
Location (Side)	Right	0 (0 %)
	Left	93 (69.4 %)
	Rectum	31 (23.1 %)
	No data	10 (7.5 %)
Location (Primary Tumor)	Descending colon	10 (7.5 %)
	Sigmoid colon	62 (46.3 %)
	Rectosigmoid region	16 (11.9 %)
	Rectum	31 (23.1 %)
	No data	15 (11.2 %)
Grade	G1	21 (15.7 %)
	G2	73 (54.4 %)
	G3	12 (9.0 %)
	No data	28 (20.9 %)
Stage	I	1 (0.7 %)
	II	8 (6.0 %)
	III	12 (9.0 %)
	IV	102 (76.1 %)
	No data	11 (8.2 %)
Number of affected organs at the time of inclusion in the study	One	48 (35.8 %)
	Two or more	86 (64.2 %)

¹Data for individual characteristics are based on the number of patients with available information. SD, standard deviation.